

Řešení modelového testu na LF MUNI

U každé otázky je právě jedna správná odpověď. Správná možnost je vyznačená tučně a pod každou otázkou najdeš vysvětlení.

Správné odpovědi

Biologie: 1) e, 2) b, 3) b, 4) a, 5) c

Fyzika: 1) a, 2) a, 3) c, 4) a, 5) a

Chemie: 1) b, 2) b, 3) c, 4) b, 5) a

Biologie

1. Jako antagonisticky působící hormony můžeme označit

- a) kortizol a aldosteron.
- b) adrenalin a noradrenalin.
- c) inzulin a glykogen.
- d) thyroxin a trijodthyronin.
- e) Žádná odpověď není správná.**

Řešení e). Antagonisté jsou hormony s opačným účinkem, například inzulin a glukagon nebo kalcitonin a parathormon. Glykogen ale není hormon – je to zásobní polysacharid. Kortizol a aldosteron jsou hormony kůry nadledvin s odlišným, ne protichůdným účinkem. Adrenalin a noradrenalin působí převážně souhlasně a thyroxin a trijodthyronin jsou hormony štítné žlázy se stejným účinkem.

2. U 30leté ženy jsme zjistili tyto hodnoty: erytrocyty $4\,500\,000$ v 1 mm^3 , sedimentace 15 mm za hodinu, leukocyty $12\,000$ v 1 mm^3 , trombocyty $280\,000$ v 1 mm^3 . Na základě těchto hodnot předpokládáme, že žena trpí

- a) anémií.
- b) zánětlivým onemocněním.**
- c) zvýšenou krvácivostí.
- d) leukémií.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení b). Erytrocyty (u žen přibližně 3,8–5,2 milionu v 1 mm^3), sedimentace (u mladších žen do 20 mm za hodinu) i trombocyty ($150\,000$ – $400\,000$ v 1 mm^3) jsou v normě. Zvýšený je jen počet leukocytů (norma $4\,000$ – $10\,000$ v 1 mm^3) – mírná leukocytóza ukazuje na zánět. U leukémie bývá počet leukocytů výrazně vyšší a obvykle jsou změněné i další hodnoty.

3. V týlním laloku se nachází

- a) sluchové centrum.
- b) zrkové centrum.**
- c) motorické centrum.
- d) senzorické centrum.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení b). V týlním laloku je primární zrková korová oblast. Sluchové centrum leží ve spánkovém laloku, motorické ve frontálním laloku (precentrální závit) a somatosenzorické v temenním laloku (postcentrální závit).

4. U kterého z uvedených onemocnění má smysl nasadit antibiotika působící na bakterie (budou mít léčebný účinek)?

- a) borelióza**
- b) klíšťová encefalitida
- c) kandidóza
- d) chřipka
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). Antibiotika působící na bakterie léčí jen bakteriální infekce. Lymeskou boreliózu způsobuje spirocheta *Borrelia burgdorferi*. Klíšťovou encefalitidu a chřipku způsobují viry a kandidózu kvasinky rodu *Candida*, která se léčí antimykotiky.

5. Pokud srovnáme zygotu, z níž se organismus vyvinul, a jaterní buňku stejného organismu, zjistíme, že obě buňky obsahují shodné molekuly:

- 1) DNA
- 2) mRNA
- 3) tRNA
- 4) rRNA

Vyber správnou kombinaci:

- a) 1
- b) 1, 4
- c) 1, 3, 4**
- d) 1, 2, 3, 4
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení c). Všechny buňky organismu vznikly mitózou ze zygoty, a mají proto stejnou DNA. tRNA a rRNA jsou ve všech buňkách stejné, protože v každé buňce zajišťují proteosyntézu. mRNA se liší – v jaterní buňce se přepisují jiné geny než v zygotě.

Fyzika

1. Najdi fyzikální rozměr (jednotku) výkonu.

- a) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
- b) $\text{J} \cdot \text{s}^{-2}$
- c) $\text{J} \cdot \text{s}$
- d) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-3}$
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). Výkon je práce vykonaná za jednotku času, jeho jednotkou je watt. Joule vyjádříme v základních jednotkách SI jako $\text{N} \cdot \text{m}$:

$$W = \text{J} \cdot \text{s}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

2. Na dně nádoby s vodou leží stlačitelný míček zatížený železnou nestlačitelnou deskou. K čemu může dojít, snížíme-li tlak nad kapalinou?

- a) Míček může teoreticky stoupnout až k hladině.
- b) Míček začne na dno nádoby působit větší silou.
- c) Míček stoupne jen pár centimetrů nade dno nádoby.
- d) Vztlková síla působící na míček poklesne.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). Na míček působí tlak nad kapalinou a hydrostatický tlak. Když tlak nad kapalinou klesne, míček se roztáhne a zvětší se vztlková síla. Pokud převýší tíhu míčku s deskou, míček začne stoupat. Při stoupání klesá hydrostatický tlak, míček se dál zvětšuje a vztlak dál roste – rovnováha je nestabilní, a míček tak může vystoupat až k hladině. Na dno proto nepůsobí větší silou a vztlak neklesá.

3. Intenzita zvuku se zvýší 850krát. O kolik decibelů vzroste hladina intenzity zvuku?

- a) 8 dB
- b) 18 dB
- c) 29 dB
- d) 36 dB
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení c). Hladina intenzity zvuku je logaritmická veličina – desetinásobná intenzita znamená nárůst o 10 dB:

$$\Delta L = 10 \cdot \log(I_2 / I_1) \text{ dB} = 10 \cdot \log 850 \text{ dB} \approx 29 \text{ dB}$$

4. V dobře izolované místnosti necháme zapnutý výrobek ledu a budeme měřit teplotu v místnosti. Jak se z dlouhodobého hlediska bude tato teplota měnit?

- a) Bude se zvyšovat.
- b) Bude se snižovat.
- c) Nebude se měnit.
- d) Při výrobě ledu se teplota krátce zvýší, ale jakmile veškerý led roztaje, teplota se vrátí na původní hodnotu.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). Výrobek ledu funguje jako tepelné čerpadlo: teplo odebrané vodě předává do místnosti a navíc do ní odevzdá i teplo vzniklé z elektrické energie, kterou spotřebuje. V izolované místnosti se tato energie hromadí, a teplota proto dlouhodobě roste – podobně jako u lednice s otevřenými dvířky.

5. Do magnetického pole o magnetické indukci $B = 0,02 \text{ T}$ vletne kolmo k magnetickým indukčním čarám částice α rychlostí $150\,000 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Vypočítej poloměr kružnicové trajektorie, kterou začne tato částice v magnetickém poli opisovat. Hmotnost jednoho nukleonu je $1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, elementární náboj $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- a) 0,16 m
- b) 0,32 m
- c) 1,6 m
- d) 3,2 m
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). Částice α je jádro helia – 2 protony a 2 neutrony. Má tedy hmotnost $4 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ a náboj $2e = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Magnetická síla působí jako dostředivá, $qvB = mv^2/r$:

$$r = mv / (qB) = (6,64 \cdot 10^{-27} \cdot 1,5 \cdot 10^5) / (3,2 \cdot 10^{-19} \cdot 0,02) \text{ m} \approx 0,16 \text{ m}$$

Chemie


1. Roztok fosforečnanu manganatého ($c = 0,3 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$) naředím 7 díly vody. Jaká je jeho nová látková koncentrace?

- a) $0,0507 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$
- b) **$0,0375 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$**
- c) $0,024 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$
- d) $0,0428 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení b). Smícháním 1 dílu roztoku se 7 díly vody vznikne 8 dílů roztoku – koncentrace klesne 8krát:

$$c = 0,3 / 8 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1} = 0,0375 \text{ mmol}\cdot\text{l}^{-1}$$

2. Vypočítej reakční teplo reakce, znáš-li vazebné energie: H–H $435 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, I–I $150 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, H–I $299 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.



- a) $13 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- b) $-13 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$**
- c) $286 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- d) $14 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení b). Reakční teplo je rozdíl energie potřebné na rozštěpení vazeb výchozích látek a energie uvolněné vznikem vazeb produktů. Záporné znaménko znamená, že reakce je exotermická:


$$\Delta H = (435 + 150) - 2 \cdot 299 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = 585 - 598 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = -13 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

3. Aldol vzniká reakcí

- a) 2 alkoholů.
- b) alkoholu a aldehydu.
- c) 2 aldehydů.**
- d) aldehydu a karboxylové kyseliny.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení c). Aldol (3-hydroxyaldehyd) vzniká aldolovou adicí dvou aldehydů v zásaditém prostředí – uhlík v poloze α jedné molekuly se naváže na karbonylový uhlík druhé. Ze dvou molekul ethanalů tak vzniká 3-hydroxybutanal, triviálně aldol.

4. Vyber derivát heterocyklu na obrázku.



- a) strychnin
- b) teofylin**
- c) atropin
- d) morfin
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení b). Na obrázku je purin. Teofylin (1,3-dimethylxanthin) je purinový alkaloid, stejně jako kofein a theobromin. Strychnin obsahuje indolový skelet, atropin tropanový a morfin isochinolinový.

5. Molekula GDP neobsahuje

- a) **fosfodiesterovou vazbu.**
- b) N-glykosidovou vazbu.
- c) anhydridovou vazbu.
- d) esterovou vazbu.
- e) Žádná odpověď není správná.

Řešení a). GDP (guanosindifosfát) obsahuje N-glykosidovou vazbu mezi guaninem a ribózou, esterovou vazbu mezi ribózou a prvním fosfátem a anhydridovou vazbu mezi oběma fosfáty. Fosfodiesterová vazba spojuje nukleotidy v nukleových kyselinách, v GDP není.